

コルポスコピー検査を受けられる方へ

検査前の注意点

- 血を固まりにくくする薬（例：ワーファリン、バファリン、バイアスピリン、オパルモンなど）を内服中の方は、検査後の出血が止まりにくい場合があるため、当院での検査は原則できません。処方されている医師とご相談ください。
- **月経前一週間と月経期間を避けて**ご予約ください。
- 膣内の洗浄や膣剤の使用は3日前よりお控えください。その他食事などは普段通りでかまいません。

検査の流れ

- 子宮の入り口に酢酸を塗布します。
- 病変を2~4か所採取します。
- 検査は10分から15分ほどかかりますが、組織を採取する時間は1~2分です。
- 特に麻酔を実施することなく実施でき、個人差がありますが、痛みは通常はそれほどありません。
- 検査後は膣内にガーゼを挿入して、30分後に止血確認を行います。

検査後の注意点

- 検査後数日から1週間程度、出血がある場合があります。生理2日目以上の出血がある場合や、出血が続く場合は受診をしてください。タンポンの使用は避け、ナプキンを当ててお過ごしください。
- 検査当日はシャワーだけにしてください。翌日から出血が少なければ入浴できます。
- プールや激しい運動は出血のある間は控えてください。
- 性交渉は再出血があるので、1週間ほどお控えください。
- 検査当日は飲酒を控え、普段よりもやや安静にするつもりでお過ごしください。